


911 pour veaux

POSITION DE RÉCUPÉRATION

POSITIONNEMENT

- ✓ Placez le veau sur son sternum.
- ✓ Tirez les pattes antérieures vers l'avant pour permettre à la poitrine de se déployer.
- ✓ Tirez les pattes postérieures vers les oreilles du veau.



PROCÉDURE

- ✓ Frottez vigoureusement le veau.
- ✓ Stimulez la respiration en piquant la cloison nasale avec un brin de paille.
- ✓ Versez quelques gouttes d'eau froide dans l'oreille pour provoquer le retour de la respiration.




RAPPELEZ-VOUS

- ✗ NE PAS suspendre le veau la tête en bas pour évacuer le liquide. Cette méthode ne fait que vider l'estomac et exercer une pression sur le diaphragme.



911 pour veaux

GESTION DU COLOSTRUM



SAVOIR QUAND AGIR

- Jumeaux
- Veaux faibles
- Mauvais réflexe de têtée
- Vêlages difficiles
- Mauvaise santé du pis
- Manque d'instinct maternel

FAIRE

- ✓ Veillez à ce que la vaccination du troupeau soit à jour.
- ✓ Intervenez tôt. L'apport idéal est de 2 litres de colostrum dans les 2 premières heures après la naissance et un autre 2 litres dans les 8 à 12 heures suivantes.
- ✓ Donnez-en suffisamment. Les veaux ont besoin d'un minimum de 100 g d'IgG lors de leur première alimentation. Veillez à ce que le produit de remplacement d'IgG totalise 100 g, ce qui peut requérir plus d'un paquet.
- ✓ Collecter le colostrum de votre troupeau. Le colostrum frais ou congelé provenant de votre ferme constitue toujours la meilleure solution.

NE PAS FAIRE

- ✗ Ne donnez pas le mauvais produit. Le produit de remplacement est destiné à être utilisé lorsqu'aucune autre source de colostrum n'est disponible et doit contenir des niveaux adéquats d'IgG. Les suppléments sont destinés à être ajoutés à l'alimentation d'un veau qui a déjà reçu du colostrum.
- ✗ Ne procédez pas automatiquement à l'alimentation par sonde. Il est toujours préférable d'essayer d'abord l'alimentation par tétine, et en cas d'échec, de passer à l'alimentation par sonde. L'alimentation par sonde place le liquide directement dans le rumen, ce qui ne permet pas une absorption maximale des IgG et des nutriments.
- ✗ Ne décongelez jamais le colostrum au micro-ondes, faites le plutôt au bain marie chaud.
- ✗ Ne donnez pas de colostrum provenant d'une autre ferme. L'utilisation de colostrum cru provenant d'autres fermes est susceptible d'introduire des maladies non présentes dans votre ferme.





911 pour veaux

ALIMENTATION PAR SONDE (ŒSOPHAGIENNE)


POSITION

- ✓ Immobilisez le veau dans un coin pour maintenir le contrôle de la tête.
- ✓ Placez la tête dans une position neutre.



INTUBATION

- ✓ Faites glisser doucement le tube. S'il y a une résistance, retirez-le et réinsérez-le.
- ✓ Palpez le cou du veau. Lorsque le tube est dans la bonne position, vous sentirez deux structures tubulaires (trachée et œsophage).



RAPPELEZ-VOUS

- ✓ Il est important d'alimenter lentement. Cela peut prendre jusqu'à 3 minutes pour que l'estomac se remplisse.
- ✓ Assurez-vous que les liquides sont à la température du corps (38 °C/100 °F).
- ✓ Avant de tirer le tube, pliez-le et tirez-le d'un seul coup pour éviter que le liquide ne soit inhalé.
- ✓ Pour éviter l'introduction d'agents pathogènes dans le troupeau, utilisez des mangeoires séparées pour les animaux malades et sains.
- ✓ Nettoyez soigneusement l'équipement.



911 pour veaux

LISTE DE CONTRÔLE DE LA DÉSHYDRATATION



DIRECTIVES D'ÉVALUATION DE LA DÉSHYDRATATION POUR LES VEAUX

Niveau de déshydratation	Comportement	Enfoncement du globe oculaire	Persistance du pli de peau
Aucune (<5 %)	Normal	Aucun	1 sec
Légère (6-8 %)	Légèrement déprimé	2-4 mm { 1/8" }	2-4 sec
Modérée (8-10 %)	Déprimé	4-6 mm { 3/16" }	4-6 sec
Sévère (10-12 %)	Comateux	6-8 mm { 1/4" }	>6 sec

Source : Geof Smith, Département de la santé de la population et de la pathobiologie, North Carolina State University



PLI DE PEAU



Effectuez un test de persistance du pli de peau en pinçant la peau sur le cou et en tirant doucement pour former une tente. Lâchez puis comptez le nombre de secondes nécessaires pour que la peau revienne à la normale.

COMPORTEMENT



Recherchez des indices comportementaux dans le troupeau, comme un veau qui ne s'étire pas lorsqu'il se lève. Surveillez les veaux aux oreilles tombantes. Une vache qui braille pour un veau ou qui montre un pis plein, indique que le veau ne tète pas. Surveillez les veaux qui semblent léthargiques ou déprimés.

YEUX



Pour évaluer si un veau a les yeux enfoncés, regardez l'espace entre la paupière inférieure et le globe oculaire. Plus l'espace est large, plus le veau est déshydraté.

ÉQUILIBRE



Soyez à l'affût des veaux qui titubent ou qui ont un mauvais équilibre.

TEMPÉRATURE



Soyez conscient du lien entre la déshydratation et l'hypothermie. La température normale est de 38-39 °C.

TÉTÉE



Faites attention aux veaux avec un réflexe de tétée faible ou arythmique.

www.BeefResearch.ca

Version: 01.2022

Scanner pour regarder une vidéo de 4 minutes (AN uniquement)




SCANNEZ-MOI

911 pour veaux

ARBRE DE DÉCISION POUR LE VÊLAGE

Quand faut-il appeler un vétérinaire?



www.BeefResearch.ca

www.MBFI.ca

Version: 01.2023




Scanner pour la vidéo
(AN uniquement)

911 pour veaux

PRÉSENTATIONS DES VÊLAGES

PRÉSENTATION ANTÉRIEURE (NORMALE)



NON DILATÉ

PRÉSENTATION
POSTÉRIEURE

PRÉSENTATION AVEC
UNE PATTE EN ARRIÈRE



PRÉSENTATION AVEC LA
TÊTE EN ARRIÈRE

PRÉSENTATION PAR
LE SIÈGE

